



Tableau récapitulatif en fonction de l'âge

	1 mois	1 mois-1 an	1 an-8 ans	> 8 ans
Position du réanimateur /enfant	Ventilation : à la tête (B à nez) MCE : se placer au pied de l'enfant	Ventilation : à la tête (B à nez) MCE : se placer au pied de l'enfant	Ventilation : à la tête (B à nez ou B à B) MCE : se placer sur le coté de l'enfant	Ventilation : à la tête (B à B) MCE se placer sur le coté de l'enfant
Ventilation ± O2	Ballon néonatal	Ballon néonatal si < 5 kg ; ballon adulte si > 5 kg	ballon adulte car > 5 kg	ballon adulte car > 5 kg
MCE	Technique : 2 pouces	2 pouces	2 doigts, 1 main	2 mains
FR/FC	2/6	1/5	1/5	2/15
Défibrillation	non	non	+/- (si notion CCC)	+ (si arythmie) 2 ; 2 ; 4J/kg
Adrénaline	10γ / kg en IVD 30γ /kg en IT	10γ / kg en IVD 30γ /kg en IT	10γ / kg en IVD 100γ /kg en IT	10γ / kg en IVD 100γ /kg en IT
Appel	Réa 1 min puis appel	Réa 1 min puis appel	Tenir compte des antécédents	Appeler en 1 ^{er} et commencer réa

Algorithme de la RCP de base chez l'enfant



Algorithme de la RCP spécialisée chez l'enfant



* amiodarone : 5 mg/kg IVD